



Адамант Медицинская Клиника
190068, Россия,
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.78
тел.: +7 (812) 740-2090
факс: +7 (812) 310-4664
www.amclinic.ru

АНКЕТА «ДРИП-ТЕСТ: ДИАГНОСТИКА ПРИЧИН НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ»

ФИО: _____

Возраст: _____ Дата исследования: _____

1	Бывает ли у Вас мочеиспускание более 6 раз в день и более 1 раза за ночь?	«Да»	«Нет»
2	Бывает ли у Вас иногда внезапный настоятельный позыв на мочеиспускание?	«Да»	«Нет»
3	Бывает ли у Вас иногда недержание мочи ночью, в горизонтальном положении или при смене положения тела?	«Да»	«Нет»
4	Связано ли у Вас недержание мочи с физическими усилиями (поднятие тяжести, кашель и т.д.)?	«Да»	«Нет»
5	Появляется ли внезапная необходимость в мочеиспускании при звуке льющейся воды или при контакте с водой?	«Да»	«Нет»
6	Можете ли Вы волевым усилием остановить выделение мочи при начавшемся недержании?	«Да»	«Нет»
7	Выделение мочи при недержании в основном:	Обильное	Небольшое количество
Общий балл			
Тип недержания: <u>ГАМП</u> : Смешаное : Стрессовое 7/0 – 6/1 – 5/2 – 4/3 – 3/4 – 2/5 – 1/6 – 0/7			

Каждый ответ «да» или «нет» равен 1 баллу. Суммируются отдельно баллы в левом и правом столбцах. Получается дробь: сумма баллов в левом столбце / сумма баллов в правом столбце. По шкале определяется недержание мочи Вашего пациента.