

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ

ДИЕТА (бесшлаковая)

Подготовка к колоноскопии **начинается за 3 дня** до исследования с соблюдения бесшлаковой диеты, которая позволяет исключить из рациона продукты, способствующие метеоризму, вздутию живота и образованию объемных каловых масс.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- свежие овощи с семечками и кожурой, а так же все разновидности зелени (капуста, редька, репа, редис, чеснок, шпинат, щавель, укроп, петрушка, салат и др.);
- свежие и сушеные фрукты и ягоды, а также блюда их содержащие, включая варенье (абрикосы, виноград, персики, крыжовник, малина, арбуз, дыня);
- цельнозерновые каши (перловая, пшеничная, бурый рис);
- цельнозерновой хлеб с добавлением орехов и семечек, хлебобулочные изделия с начинкой из орехов или сухофруктов, а так же все зерносодержащие продукты (цельное зерно, отруби, продукты содержащие измельченное зерно, орехи, мак, кокосовую стружку и др.);
- попкорн, мармелад;
- бобовые (горох, фасоль, чечевица);
- жесткое волокнистое мясо;
- копчености и соленья, салатные заправки с семенами и кусочками овощей, горчица в зернах;
- йогурты с добавлением орехов, семечек, ягод или кусочков фруктов;
- соки и напитки с добавлением фиолетового или красного пищевого красителя;
- напитки, приготовленные путем брожения или добавления углекислоты.

РАЗРЕШАЕТСЯ:

- небольшие порции отварной или приготовленной на пару курицы, индейки, телятины, или в виде котлет, фрикаделек;
- нежирная рыба и морепродукты;
- мучные изделия, приготовленные из муки высшего сорта (без добавок);
- макаронные изделия, манная и овсяная каши;
- блюда из картофеля без кожицы;
- нежирные прозрачные мясные бульоны;
- сыр, масло, творог, йогурты (не содержащие добавок);
- продукты молочнокислого брожения;
- яйца.

ВАЖНО соблюдать питьевой режим!



Адамант Медицинская Клиника
190068, Россия,
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.78
тел.: +7 (812) 740-2090
факс: +7 (812) 310-4664
www.amclinic.ru

ПОДГОТОВКА препаратом **ФОРТРАНС**

Прием лекарственных средств обсудить с лечащим врачом или с врачом-анестезиологом. Если Вы принимаете жизненно важные препараты (при сахарном диабете, артериальной гипертензии — их не отменяют).

Если Вы страдаете привычными запорами, диету рекомендуется начать за 4-5 дней, ежедневно принимать слабительные препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно несколько увеличить их дозу или вечером за ДВА дня до исследования усилить подготовку приемом 3 пакетиков саше ДЮФАЛАК (по 15 мл), которые необходимо запить 1 стаканом воды.

Купить упаковку препарата **«ФОРТРАНС»**

Накануне дня исследования:

- 08:00-09:00 завтрак согласно списку **разрешенных** продуктов;
- до 13:00 легкий обед согласно списку **разрешенных** продуктов и прием жидкости;
- в **17:00** начать прием препарата ФОРТРАНС. Каждый пакетик растворить в 1 литре воды, пить в течение 1 часа. Всего выпить 4 пакетика за 4 часа. Раствор рекомендуется охладить, отжать в него сок лимона.

*Одновременно с приемом последней порции **Фортранса** необходимо принимать **ЭСПУМИЗАН** в суспензии (50мл) или 5-6 капсул (для снижения дискомфорта и улучшения качества осмотра).*

Прием дополнительной светлой жидкости допускается.

Не ужинать!

Утром в день исследования **не пить, не есть и не курить!** (За исключением приема жизненно важных препаратов)

При **двухэтапной** подготовке, если **Эндоскопическое** исследование запланировано после **12.00** часов, возможен прием препарата Фортранс вечером в 19-21 час (первые 2 литра) и утром в 6-8 часов (вторые два литра).

В этом случае обязательно соблюсти 4-х часовой безводный промежуток (от момента окончания приема жидкости до момента начала **Эндоскопической** процедуры).



Адамант Медицинская Клиника
190068, Россия,
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.78
тел.: +7 (812) 740-2090
факс: +7 (812) 310-4664
www.amclinic.ru

ПОДГОТОВКА препаратом **ЭЗИКЛЕН**

Прием лекарственных средств обсудить с лечащим врачом или с врачом-анестезиологом. Если Вы принимаете жизненно важные препараты (при сахарном диабете, артериальной гипертензии — их не отменяют).

Если Вы страдаете привычными запорами, диету рекомендуется начать за 4-5 дней, ежедневно принимать слабительные препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно несколько увеличить их дозу или вечером за ДВА дня до исследования усилить подготовку приемом 3 пакетиков саше ДЮФАЛАК (по 15 мл), которые необходимо запить 1 стаканом воды.

Купить упаковку препарата **«ЭЗИКЛЕН»**

Накануне дня исследования:

- 08:00-09:00 завтрак согласно списку **разрешенных** продуктов;
- до 13:00 легкий обед согласно списку **разрешенных** продуктов и прием жидкости;
- в **18:00 (первая порция)**: растворить **один** пакетик в стакане на 500 мл воды, приготовить еще 500-1000 мл воды, либо светлой жидкости(чай, сок без мякоти) – все выпить в течение 2 часов.

*Одновременно с приемом второй порции **ЭЗИКЛЕНа** необходимо принимать **ЭСПУМИЗАН** в суспензии (50мл) или 5-6 капсул (для снижения дискомфорта и улучшения качества осмотра).*


- в **20:00 (вторая порция)**: растворить **один** пакетик в стакане на 500 мл воды, приготовить еще 500-1000 мл воды, либо светлой жидкости(чай, сок без мякоти) – все выпить в течение 2 часов.

Не ужинать!

Утром в день исследования **не пить, не есть и не курить!** (За исключением приема жизненно важных препаратов)

При **двухэтапной** подготовке, если **Эндоскопическое** исследование запланировано после **12.00** часов, возможен прием препарата Эзиклен вечером в 20-21 час (**первая порция**) и утром в 6- 7 часов (**вторая порция**).

В этом случае обязательно соблюсти 4-х часовой безводный промежуток (от момента окончания приема жидкости до момента начала **Эндоскопической** процедуры).



Адамант Медицинская Клиника
190068, Россия,
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.78
тел.: +7 (812) 740-2090
факс: +7 (812) 310-4664
www.amclinic.ru

ПОДГОТОВКА препаратом **ПИКОПРЕП** (рекомендуется при весе пациента до 80 кг)

Прием лекарственных средств обсудить с лечащим врачом или с врачом-анестезиологом. Если Вы принимаете жизненно важные препараты (при сахарном диабете, артериальной гипертензии — их не отменяют).

Если Вы страдаете привычными запорами, диету рекомендуется начать за 4-5 дней, ежедневно принимать слабительные препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно несколько увеличить их дозу или вечером за ДВА дня до исследования усилить подготовку приемом 3 пакетиков саше ДЮФАЛАК (по 15 мл), которые необходимо запить 1 стаканом воды.

Купить упаковку препарата «**ПИКОПРЕП**»

Накануне дня исследования:

- 08:00-09:00 завтрак согласно списку **разрешенных** продуктов;
- до 13:00 легкий обед согласно списку **разрешенных** продуктов и прием жидкости;
- в **17:00** (первая порция): растворить **первый** пакетик в стакане (**150** мл) чистой питьевой воды и размешивать 2-3 минуты до полного растворения. Выпить. И запить не менее, чем 3 стаканами прозрачной жидкости в течение одного часа (вода, негазированные безалкогольные напитки, чай, кофе, фруктовый сок без мякоти).

*Одновременно с приемом второй порции **ПИКОПРЕП** необходимо принимать **ЭСПУМИЗАН** в суспензии (10мл) или 5-6 капсул (для снижения дискомфорта и улучшения качества осмотра).*

- в **20:00** (вторая порция): растворить **второй** пакетик в стакане (**150** мл) чистой питьевой воды и размешивать 2-3 минуты до полного растворения. Выпить. И запить не менее, чем 3 стаканами прозрачной жидкости в течение одного часа (вода, негазированные безалкогольные напитки, чай, кофе, фруктовый сок без мякоти).

Не ужинать!

Утром в день исследования **не пить, не есть и не курить!** (За исключением приема жизненно важных препаратов)

При **двухэтапной** подготовке, если **Эндоскопическое** исследование запланировано после **12.00** часов, возможен прием препарата ПИКОПРЕП вечером в 20-21 час (первая порция) и утром в 6- 7 часов (вторая порция).

В этом случае обязательно соблюсти 4-х часовой безводный промежуток (от момента окончания приема жидкости до момента начала **Эндоскопической** процедуры).



Адамант Медицинская Клиника
190068, Россия,
г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д.78
тел.: +7 (812) 740-2090
факс: +7 (812) 310-4664
www.amclinic.ru

- **Диагностический комплекс: Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС)**

Что входит в программу:

- проведение ФГДС под внутривенным наркозом
- ЭКГ
- тест на хеликобактер пилори (H. Pylori)

Стоимость: 13 510 рублей

- **Диагностический комплекс: Фиброколоноскопия (ФКС)**

Что входит в программу:

- проведение ФКС под внутривенным наркозом
- ЭКГ

Стоимость: 16 230 рублей

- **Диагностический комплекс: Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и колоноскопия (ФКС)**

Что входит в программу:

- проведение ФГДС под внутривенным наркозом
- проведение ФКС под внутривенным наркозом
- ЭКГ
- тест на хеликобактер пилори (H. Pylori)

Стоимость: 23 000 рублей

ВНИМАНИЕ!

При прохождении комплексных процедур в пакет **НЕ ВХОДИТ** взятие биопсии и гистология.
При взятии биопсии взимается доплата в размере 1 580 рублей за взятие биопсии и от 5 150 до 5 780 рублей за каждое гистологическое исследование.